

PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTE EN RÉPONDANT AU QUESTIONNAIRE CI-DESSOUS

Nom

Nom de naissance.....

Prénom

Date de naissance.....

Téléphone

Adresse

Étiquette patient
Réservé au laboratoire

Prélevé : Laboratoire Domicile Cabinet médical EDS :..... Service :.....

Traitement : En cours ou récent Non Oui A venir

Lequel Débuté le/...../..... ou arrêté le/...../.....

Date et heure de recueil :/...../..... à h.....

Renseignements cliniques :

Ces informations seront prises en compte pour l'interprétation et la validation biologique des résultats (Norme NF EN ISO 15189)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Prostatite | <input type="checkbox"/> Orchite |
| <input type="checkbox"/> Epididymite | <input type="checkbox"/> Suspicion d'infection sexuellement transmissible (IST) |
| <input type="checkbox"/> Contrôle après traitement | <input type="checkbox"/> Autres : |

Signes cliniques : Non Oui

Si oui, lesquels ?

- Douleurs, depuis quand ?.....
- Fièvre, depuis quand ?.....
- Écoulement, depuis quand ?..... Autres :

Partie à remplir par le site périphérique :

Heure de réception :h.....

Date:/...../.....

Par

Conforme : O Non Oui

Si non Motif :

Modalités de recueil :

Le patient **doit respecter** :

- Une abstinence de **2 à 8 jours**
- Avoir bu la veille **2 litres d'eau**

Le prélèvement doit être réalisé avant tout traitement antibiotique ou après l'arrêt de celui-ci (supérieur à 5 à 6 semaines si recherche de Chlamydiae et mycoplasmes, supérieur à 48 h pour les germes banals), sauf avis contraire du médecin.

Mesures d'hygiène avant le prélèvement :

Merci de respecter les mesures suivantes avant d'effectuer le recueil

- **Uriner avant le recueil**

- **Se laver les mains** soigneusement avec du savon et les essuyer avec du papier absorbant .
- **Se nettoyer** la verge et le prépuce après décalottage avec la **compresse désinfectante** fournie par le laboratoire, bien insister au niveau du méat urinaire.

Recueil par masturbation :

- Ouvrir le flacon sans mettre les doigts à l'intérieur pour éviter une contamination du prélèvement. Poser le couvercle vers le haut.
- **Recueillir directement par masturbation la totalité du sperme.**
- Une fois le recueil terminé, refermer correctement le flacon pour éviter de perdre la moindre quantité de prélèvement.
- Noter **votre identification complète** sur le flacon et le déposer dans la zone dédiée au laboratoire,s ou le rapporter au laboratoire dans les **2 heures maximum** à l'abri du froid (poche intérieure) après le recueil.

Recommandations Rémic